

## Sarcoma de Kaposi perianal

### Perianal Kaposi sarcoma

Osmaldy Alpízar-Quesada<sup>1\*</sup> <https://orcid.org/0000-0001-6755-0080>

<sup>1</sup>Especialista de Primer Grado en Proctología y Medicina General Integral. Profesor Instructor. Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila. Hospital General Provincial Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”. Ciego de Ávila, Cuba.

\*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: [oalpizar@infomed.sld.cu](mailto:oalpizar@infomed.sld.cu)

Recibido: 27/05/2019

Aprobado: 09/06/2019

Se presenta una imagen de un tumor perianal en un paciente masculino, de 27 años de edad, con antecedentes patológicos personales de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) de siete años de evolución. Durante la anamnesis refirió que desde seis meses anteriores a la consulta presentaba sensación de masa perianal y constipación. Mediante la biopsia se corroboró que se trataba de un sarcoma de Kaposi (Fig. 1) de aproximadamente 20 cm de superficie irregular, friable, con abundantes secreciones mucosas.



**Fig. 1** – Tumor perianal. Obsérvese su superficie irregular, friable, con abundantes secreciones mucosas.