

Acné queloideo en la parte occipital de la región craneal Keloid acne in the occipital part of the cranial región

Grecia María Giniebra-Marín^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-2179-4482>

¹Máster en Urgencias Médicas en la Atención Primaria de Salud. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral y Dermatología. Profesor Asistente. Investigador Agregado. Hospital Clínico Quirúrgico Docente León Cuervo Rubio. Pinar del Río, Cuba.

*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: greciam@infomed.sld.cu

Palabras clave: acné queloideo; alopecia; cráneo.

Keywords: alopecia; keloid acne; skull.

Recibido: 14/03/21

Aprobado: 24/06/21

Se presenta una imagen fotográfica de un acné queloideo en la parte occipital de la región craneal de un paciente masculino de 32 años de edad con fototipo de piel V y sin antecedentes patológicos personales de interés (Fig. 1). Hace aproximadamente cinco años comenzó con lesiones eritematopustulosas en la parte occipital que confluyeron hasta formar una gran placa fibrosa de aspecto queloideo con alopecia cicatrizal. Fué tratado con esteroides intralesionales sin lograr mejoría.

El acné queloideo de la nuca es una afección inflamatoria crónica de los folículos pilosos, que forma parte de las foliculitis cicatrizales. Es más frecuente en el sexo masculino, en el color de la piel negra y

las edades medias de la vida. Se localiza principalmente en la nuca, aunque puede presentarse en otras partes del cuero cabelludo. Es una enfermedad rara, de etiología desconocida, de difícil tratamiento, de buen pronóstico y con repercusión desde el punto de vista estética en quienes la padecen.



Fig. 1 – Acné queiloideo en la parte occipital de la región craneal.

Conflictos de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribuciones de los autores

Grecia María Giniebra-Marín: conceptualización, investigación, recursos y redacción-revisión y edición.

Financiación

Hospital Clínico Quirúrgico Docente León Cuervo Rubio. Pinar del Río.